

## TROUVER LES ADRESSES

### Adresses des CDAG

(Consultation de dépistage anonyme et gratuit) et

### Ciddist

(Centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles) en Ile-de-France

<http://www.sida-info-service.org/Centre-De-Depistage-VIH-Sida-Region-Ile-de-France>



### Adresses des CPEF

Centre de planification et d'éducation familiale

<http://www.sante.gouv.fr/les-centres-de-planification-ou-d-education-familiale.html>

### Pour faire un test rapide

<http://www.sida-info-service.org/?TROP-ou-Test-de-depistage-rapide>



### Localisation des CDAG et des pharmacies : l'application TUP

<http://www.trouverunpreservatif.fr/>



### sida-info-service.org

0 800 840 800 (appel confidentiel, anonyme et gratuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24)

### hepatites-info-service.org

0 800 845 800 (appel confidentiel, anonyme et gratuit, 7 jours sur 7, de 8 à 23 heures)

### « Et hop, au CDAG ! », une vidéo du Crips IDF

<http://www.lecrips-idf.net/zoom?media=videos&id=2808>



On appelle dépistage la recherche d'une maladie à un stade précoce, avant que des symptômes se manifestent, afin de prévenir son aggravation.

Pour l'infection à VIH et les hépatites B et C, le dépistage consiste en un test, réalisé selon différentes techniques, qui détecte des éléments indiquant la présence du virus dans le corps (anticorps, antigènes).

### En cas de dépistage

- D'une infection à VIH : un traitement arrête la progression de la maladie.
- D'une hépatite B qui n'a pas guéri spontanément : un traitement stabilise la maladie et protège le foie.
- D'une hépatite C : un traitement aboutit à la guérison plus de neuf fois sur dix.



**Le dépistage est une démarche volontaire, consentie par la personne**



?  
À quel moment pratiquer un dépistage

?  
Comment faire un dépistage en pratique

**Suite à une prise de risque**

- Non utilisation du préservatif.
- Rupture de préservatif.
- Mise en commun ou partage de matériel pour sniffer, fumer ou s'injecter des drogues (seringue, paille, filtre, récipient).

**Afin de faire le point sur sa santé**

- Pour savoir.
- Avant d'arrêter l'usage du préservatif dans une relation stable.
- En cas de projet de grossesse.

- Demander à son médecin généraliste de prescrire les tests qui sont réalisés dans un laboratoire d'analyses. La consultation (23 euros) est remboursée à 65 % et les tests à 100 %.
- Ou se rendre dans un lieu de dépistage anonyme et gratuit (CDAG, Ciddist, CPEF).
- Ou prendre contact avec une association qui réalise gratuitement des tests rapides.

Type de test	Quel virus ?	Comment ?	Où aller ?	Quel délai de réponse ?
Test sur prise de sang	VIH VHB VHC	Prélèvement au bras	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dans un laboratoire avec une ordonnance de son médecin</li> <li>▪ Dans un CDAG (1) ou un Ciddist (2)</li> <li>▪ Dans un CPEF (3)</li> </ul>	2 à 5 jours
Test rapide (TroD)	VIH	Prélèvement d'une goutte de sang au bout du doigt	Dans une association qui pratique des tests rapides	30 minutes

(1) CDAG : Consultation de dépistage anonyme et gratuit  
 (2) Ciddist : Centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles  
 (3) CPEF : Centre de planification et d'éducation familiale

Dépistages de l'infection du VIH et des hépatites B (VHB) et C (VHC)

